











VONDOZEB® DG






Composizione	Mancozeb puro 75%
Formulazione	Microgranuli idrodispersibili
Tempo di sicurezza	7 giorni per pomodoro e patata; 28 giorni per le altre colture

Indice di rischio	Xi - irritante	N° di registrazione	12263 del 15.10.2004
Class. ambientale	N	Confezione	Kg 25

© Marchio registrato CEREXAGRI

Colture	Avversità	Dosi g/hL	Note
 POMACEE (Melo - Pero)	Ticchiolatura, Glomerella, Septoria, Ruggine, Alternaria, Monilia, Gleodes	150 - 250	
 VITE	Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero	200 - 250	
 POMODORO (in campo ed in semenzaio)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi ed Antracnosi	150 - 200	
 PATATA	Peronospora	200	
 GAROFANO	Ruggine	200 - 250	
 FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA	Ruggine, Septoria, Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Elminthosporium, Rhizoctonia, Ophiobolus, Cercospora	2 - 2,5 kg/Ha	
 PIOPPO	Marssonina e Ticchiolatura	400 - 500	
 TABACCO	Peronospora tabacina	100 - 150 200	In semenzaio In pieno campo
 ASPARAGO	Ruggini	2,1 Kg/Ha	
 ROSA	Peronospora	200 - 250	

CONCIA DELLE SEMENTI

 AVENA, FRUMENTO, MAIS, ORZO, RISO, SEGALE	Brusone, Carboni, Carie, Elmintosporiosi, Fusariosi	150 - 200 g ogni 100 Kg di seme	
 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercospora, Fusarium, Mal del Piede, Mal Vinato, Marciume del Cuore, Rizoctonia	250 - 300 g ogni 100 Kg di seme	
 ORTAGGI	Fusariosi, Phytium, Rizottoniosi	250 - 300 g ogni 100 Kg di seme	
 PATATA	Fusarium, Rizottoniosi, Alternaria	300 - 400 g ogni 100 Kg di seme	
 GIRASOLE	Fusarium, Phytium	300 - 350 g ogni 100 Kg seme	



VONDOZEB® DG è un agrofarmaco a base di mancozeb formulato sotto forma di microgranuli idrodispersibili, impiegabile oltre che su vite e pomacee, anche su nuove colture quali patata oppure pomodoro anche dopo la fioritura del primo palco.