

# POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO

**INSETTICIDA - FUNGICIDA IN FORMULAZIONE LIQUIDA.**



## **Autorizzato in agricoltura biologica**

**Registrazione n.** 909 del 22/02/1973

**Composizione:** Polisolfuro di calcio 30.0% (pari a 380.0 g/l)

### **Indicazione di pericolo:**

*Tossicologica:* irritante (Xi)

*Ecotossicologica:* Pericoloso per l'ambiente (N)

*Chimico-Fisica:* --

## **REGISTRAZIONI DEL PRODOTTO**

### **Melo**

Intervallo di sicurezza: 30 giorni

### **Oidio del Melo**

Dose di impiego: 1-2 kg/hl

Consigli d'uso: Eseguire dei trattamenti primaverili-estivi. Effettuare dei trattamenti nelle seguenti fasi: nella fase pre-fiorali con una dose di 2 Kg/hl, nei trattamenti primaverili, da ingrossamento gemme a bottoni fiorali. Nella fase post-fiorali alla dose di 1,5 Kg/hl; successivamente con una dose di 1 Kg/hl. Non somministrare con temperature superiore a 30gradi C.

---

### **Ticchiolatura**

Dose di impiego: 1-2 kg/hl

Consigli d'uso: Eseguire dei trattamenti primaverili-estivi. Effettuare dei trattamenti nelle seguenti fasi: nella fase pre-fiorali con una dose di 2 Kg/hl, nei trattamenti primaverili, da ingrossamento gemme a bottoni fiorali. Nella fase post-fiorali alla dose di 1,5 Kg/hl; successivamente con una dose di 1 Kg/hl. Non somministrare con temperature superiore a 30gradi C.