

NOIDIO® GOLD 10 EC

FUNGICIDA SISTEMICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE PARTICOLARMENTE INDICATO CONTRO TICCHIOLATURA E OIDIO DEL MELO, TICCHIOLATURA DEL PERO E OIDIO DEL PESCO, DELLA VITE, DEL TABACCO E DI NUMEROSE ALTRE COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI



COMPOSIZIONE:	Penconazolo puro	10,2% (=100 g/l)
FORMULAZIONE:	Concentrato emulsionabile	
CLASSIFICAZIONE:	Non classificato	
REGISTRAZIONE:	Ministero della Salute n. 11926 del 04.02.2004	
CONFEZIONI:	Bottiglia da Lt. 0,250	Cartone 20x0,250 Lt.
	Bottiglia da Lt. 1	Cartone 12x1 Lt.

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE

NOIDIO® GOLD 10 EC è un fungicida sistemico caratterizzato da una elevata azione preventiva, curativa e bloccante contro diversi funghi: la Ticchiolatura del Pero e del Melo, l'Oidio del Melo, del Pesco, della Vite e di numerose colture orticole, ornamentali e da fiore. **NOIDIO® GOLD 10 EC** viene assorbito velocemente dalle piante (a seconda delle colture e delle temperature da 1 a 6 ore). L'assorbimento del prodotto e la successiva sistemicità a livello ottimale si hanno con temperature di 20°C e con vegetazione in attiva crescita. Contro la Ticchiolatura il prodotto esplica una azione retroattiva sino a 96-100 ore.

VANTAGGI

NOIDIO® GOLD 10 EC agisce all'interno della pianta e, raggiunta la completa penetrazione non può più essere dilavato da piogge successive al trattamento. L'attività del **NOIDIO® GOLD 10 EC** si esplica nel contatto tra il fungo e gli organi vegetali inibendo la formazione degli austori. **NOIDIO® GOLD 10 EC** è selettivo per l'entomofauna utile ed è suggerito nei programmi di difesa integrata.

MODALITÀ DI IMPIEGO			
Coltura	Avversità	Dosi di impiego per HI	Note
Vite	Oidio	ml 25-30	Trattamenti preventivi: In pre-post fioritura intervenendo ogni 14-16 gg.
		ml 15-20	In pre-post fioritura intervenendo ogni 7-10 gg.
		ml 50	Con attacchi di Oidio in atto (primi sintomi): Effettuare due trattamenti ad intervalli di 5-7 gg. continuare poi con i trattamenti di tipo preventivo.
Melo	Ticchiolatura	ml 30-40	Trattamenti preventivi: Ogni 6-8 gg. fino alla fase di frutto noce. Dopo ogni 10-15 gg. Gli intervalli minori devono essere utilizzati in caso di condizioni favorevoli alla malattia. Tali trattamenti sono sufficienti a controllare anche l'Oidio.
		ml 40-45	Trattamenti curativi: Intervenendo entro 100 ore dalla pioggia infestante.
		ml 40-45	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): Effettuare due applicazioni a distanza di 5-7 gg. quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda di usare il NOIDIO® GOLD 10 EC in miscela con un prodotto di copertura
	Oidio	ml 30-40	Trattamenti preventivi: Ogni 10 gg. nei trattamenti primaverili. Nei trattamenti estivi intervenire ogni 10-14 gg. Le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte pressione della malattia.

MODALITÀ DI IMPIEGO			
Coltura	Avversità	Dosi di impiego per HI	Note
Melo	Oidio	ml 30-35	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): Intervenire a cadenza settimanale per 3-4 volte per controllare infezioni in atto ed il risanamento dei getti colpiti dalle infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
	Malattie da conservazione (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicillium</i> spp., ecc.)	ml 40-45	Effettuare 2-3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta.
Pera	Ticchiolatura	ml 25-35	Trattamenti preventivi: Alla cadenza di 10-12 gg. per tutta la stagione. Utilizzare la dose maggiore e gli intervalli più brevi se le condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo della malattia.
		ml 30-40	Trattamenti curativi: Intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infestante.
		ml 30-40	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): Effettuare due applicazioni a distanza di 5-7 gg. quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. Si raccomanda di usare il <i>NOIDIO® GOLD 10 EC</i> in miscela con un prodotto di copertura
Pesco	Oidio	ml 40-50	Trattamenti preventivi: In aree ad alta pressione di infezione oidica e su varietà sensibili intervenire dalla caduta dei petali ad intervalli di 10-14 gg.. In aree a bassa pressione trattare ogni 14-21 gg. se necessario intervenire in presenza dei primi sintomi. Usare le dosi più elevate contro Monilia, Bolla e Corineo. Il <i>NOIDIO® GOLD 10 EC</i> esplica una azione collaterale sufficiente se sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
	Malattie da conservazione (<i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicillium</i> spp.)	ml 50	Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta.
Melone, Zucchini, Zucca, Cetriolo, Carciofo, Pisello. — Pomodoro e Peperone (solo in pieno campo)	Oidio	ml 25-50	In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 interventi ad intervalli di 14-16 gg. a seconda della coltura e della pressione di infezione oidica. Su Pomodoro e Peperone effettuare al massimo 2 interventi.
Culture ornamentali e da fiore	Oidio, Ruggini	ml 25-50	Intervenire ogni 10-14 gg. a seconda della coltura e della pressione delle infezioni oidiche. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diversa sensibilità si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

AVVERTENZE - CONSIGLI UTILI

Le dosi si riferiscono all'impiego di attrezzature a volume normale. Il ***NOIDIO® GOLD 10 EC*** va diluito nella quantità di acqua sufficiente a bagnare bene la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

SU TUTTE LE COLTURE SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta posta sulle confezioni.