








INSETTICIDI

CIPERTHRIN PLUS

CIPERTHRIN PLUS è un insetticida piretroide ad elevato potere abbattente ed ampio spettro d'azione. Trova largo impiego sia sulle colture frutticole che su quelle erbacee industriali (barbabietola, mais, etc.), così come in orticoltura. La moderna formulazione liquida di CIPERTHRIN PLUS, senza solventi o coadiuvanti pericolosi, risulta tossicologicamente "non classificata".



Composizione	Cipermetrina pura 10,9% (= 100 g/L)		
Formulazione	Emulsione concentrata		
Tempo di sicurezza	3 giorni per soia; 7 giorni per pisello, fagiolino, cavolo broccolo, cavolfiore; 14 giorni per agrumi, drupacee, pomacee, cavolo cappuccio, cipolla, patata; 21 giorni per pomodoro, barbabietola da zucchero; 28 giorni per vite e mais; 42 giorni per frumento; 60 giorni per tabacco		
Indice di rischio	Non classificato	N° di registrazione	12491 del 20.04.2005
Class. ambientale	N	Confezione	L 1

Colture	Avversità	Dosi mL/hL	Note
 AGRUMI (arancio, limone)	Afidi, Mosca bianca Cocciniglie, Mosca degli agrumi	37 - 50 50 - 75	
 DRUPACEE (pesco ciliegio)	Afidi Cocciniglie, Anarsia, Cidia, Mosca della frutta, Ricamatrici, Tignole, Tripidi Insetti svernanti e uova di acari	37 - 50 50 - 75 50 - 75	A "bottoni rosa", aggiungendo 1,5 litri di OVIPRON® TOP
 POMACEE (melo, pero)	Afidi Cocciniglie, Fillominatori, Ricamatrici e lepidotteri in genere, Carpocapsa Psylla (aggiungere bagnante) - Contro adulti svernanti - Sulle uova mature della prima generazione - Contro la 3ª generazione Insetti svernanti e uova di acari	37 - 50 50 - 75 50 75 100 100 - 150 50 - 75	Su uova mature prima della comparsa delle mine A fine inverno All'apparire delle prime neanidi Inizio melata Se necessario Fra "orecchiette di topo" e "mazzetti differenziati" aggiungendo 1,5 litri di OVIPRON® TOP
 VITE	Cocciniglie, Sigaraio Tignola e Tignoletta	50 - 60 50 - 75	
 ORTAGGI (cavolo broccolo, cavolo, cappuccio, cavolfiore, pisello, fagiolino, cipolla, pomodoro, patata)	Afidi, Mosca bianca Cavolaia, Piralide, Tripidi, Nottue Dorifora	37 - 50 50 - 75 50 - 65	
 FRUMENTO	Afidi, Lema	37 - 50	
MAIS	Afidi Piralide, Nottue	37 - 50 50 - 75	
SOIA	Afidi, Cimice verde, Tripidi	37 - 50	
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Afidi Altica Cassida, Cleono, Lisso	250 - 300 mL/ha 500 - 600 mL/ha 400 - 500 mL/ha	
TABACCO	Afidi, Mosca bianca Nottue, Tripidi	37 - 50 50 - 75	
PIOPPO	Saperda, Criptorinco	75 - 100	
 FLOREALI, ORNAMENTALI (in campo)	Afidi, Mosca bianca Maggiolino, Tripidi, Nottue Bega del garofano e lepidotteri in genere	37 - 50 50 - 75 75 - 100	

