



CANTUS®

FUNGICIDA POLIVALENTE PER DRUPACEE, MELO, PERO, VITE E POST-RACCOLTA DEL KIWÌ

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono 50 g di **Boscalid**

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili (WG)

CLASSIFICAZIONE

N, pericoloso per l'ambiente

REG. MIN. SALUTE

N° 12862 del 12-07-2006

CONFEZIONE

Flacone da 1 kg

IMBALLO

Cartone - da 10 flaconi

CARATTERISTICHE

È un fungicida attivo sull'Alternaria del Melo, sulla Botrite della Vite e del Kiwi, sulla Maculatura bruna del Pero, sulla Monilia delle Drupacee e sull'Oidio della Vite.

MODALITÀ D'USO

Per la Vite i momenti chiave per il controllo della Botrite sono:

- Fine fioritura
- Pre-chiusura grappolo
- Invaiaatura
- Pre-raccolta

Per sfruttare a pieno anche l'efficacia antioidica di **CANTUS®**, la fase più indicata per intervenire è la pre-chiusura grappolo. Il programma di difesa contro la Botrite va completato con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. ROVRAL® e/o SCALA®). Per Drupacee, Melo e Pero si consigliano applicazioni di tipo preventivo, intervenendo in relazione alla pressione della malattia e all'andamento delle precipitazioni, mentre per il Kiwi l'applicazione con **CANTUS®** va eseguita in post-raccolta.

AVVERTENZE

Su Vite, **CANTUS®** deve essere applicato preventivamente tenendo sempre presente che forte umidità (pioggia o nebbia) e ferite, soprattutto degli acini, provocate da grandine, insetti (**Tignola** e **Tignoletta**) o funghi (**Oidio**), favoriscono lo sviluppo della Botrite. Si consiglia di impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando il gocciolamento della vegetazione. Nel caso di trattamenti con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha su Vite, fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella e da intendersi come minime. Per Drupacee, Melo e Pero il prodotto è da inserire in una specifica strategia di difesa, rispettando le dosi ad ettaro, indipendentemente dai volumi d'acqua distribuiti.

COLTURA	PATOGENI	CONDIZIONI D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	DOSE (kg/ha)	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ACTINIDIA (KIWI) Post-raccolta	Botrite	Bagni	75	-	1	60
ALBICOCCO CILIEGIO NETTARINA PESCO SUSINO	Moniliosi	Fogliare	40	0,4	3	3
MELO	Alternariosi	-	25	0,375	3	7
PERO	Maculatura bruna	Fogliare	27	0,4	3	7
VITE	Botrite, Oidio	Fogliare	100-120	1-1,2	1	28