



Art.-Nr. 26437

# Finalsan® Plus

L'azione erbicida del prodotto si manifesta  
entro un giorno

efficace anche sulle infestanti più  
difficili

efficace contro alghe e muschi

utilizzato in tutto il periodo  
vegetativo



Per maggiori informazioni visita  
[www.progema-plantcare.com](http://www.progema-plantcare.com)



**10 L**  
Contenuto: netto

1125-1250001039



# Finalsan® Plus

Erbicida totale contro erbe infestanti,  
muschi e alghe - Concentrato solubile

## COMPOSIZIONE

Acido Pelargonico puro	g. 18,52 (= 186,7 g/L)
Idrazide maleica	g. 2,98 (= 30 g/L)
Coformulanti q.b.a	g. 100

Registrazione del Ministero della Salute n. 13218 del 27.06.2011

W. Neudorff GmbH KG  
An der Mühle 3 · D-31860 Emmerthal (Germania) · Tel. +49 (0) 51 55/624-0

## Stabilimento di produzione:

W. Neudorff GmbH KG · D-21337 Lüneburg (Germania)

## Distribuito da:

Escher Srl · Via Miles 2 · 20873 Cavenago Brianza (MB) · Tel: 0295339216

### INDICAZIONI DI PERICOLO: ---

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE: P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

**REAZIONE: ---**

**CONSERVAZIONE: P401** Conservare lontano da alimenti o mangimi e

da bevande.

**SMALTIMENTO: ---**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. PERSONE ED ANIMALI POSSONO RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE IMMEDIATAMENTE DOPO CHE LA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE SI È ASCIUGATA.**

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:  
**ACIDO PELARGONICO 18,52 % e IDRAZIDE MALEICA 2,98 %** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**ACIDO PELARGONICO: -**

**IDRAZIDE MALEICA: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.**

**Terapia: sintomatica.**

**Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

## ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Contenuto: **10 L** Partita n.



Etichetta autorizzata con D.D. del 12/11/2012

1125-1250001040





## CARATTERISTICHE:

**Finalsan® Plus** è un erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base di idrazide maleica e di acido pelargonico. È efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (*Taraxacum officinale*), plantaggine (*Plantago maior*), *Poa spp.*, *Lamium sp.*, *Stellaria media*, stoppione (*Cirsium arvense*), *Polygonum aviculare*, muschi ed alghe.

L'azione di **Finalsan® Plus** è particolarmente efficace contro infestanti giovani ed in crescita attiva. Non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe. **Finalsan® Plus** non possiede alcun effetto residuale e si potrebbe verificare la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento.

L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno.

**Finalsan® Plus** non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili (*Typhlodromus pyri*) e per le api.

## DOSI DI IMPIEGO:

- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline**: impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in crescita attiva fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su colture floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole), impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le colture floreali ed ornamentali stesse. Intervenire durante il

periodo vegetativo quando le infestanti sono in crescita attiva fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno. Non usare **Finalsan® Plus** per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.

- Contro alghe e muschi in **aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline**. Impiegare il prodotto alla dose di 200 ml/litro d'acqua (pari a 1 Litro di prodotto in 5 Litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadro di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

## Avvertenze:

Il prodotto, dopo diluizione in acqua, viene applicato mediante pompa a spalla con lance dotate di attrezzature protettive (schermi o campane).

Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare di colture limitrofe provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.

Temperature inferiori ai 10 °C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.

### ATTENZIONE:

Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che **Finalsan® Plus** espliciti appieno la sua efficacia. Il prodotto può essere applicato senza danno su superfici che presentano lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento. Le eventuali macchie biancastre che si potrebbero formare a seguito del trattamento vengono completamente e prontamente eliminate da una pioggia o da un lavaggio. In caso di impiego su superfici costituite da diverso materiale effettuare piccoli saggi preliminari (in parti meno visibili) prima di intervenire su scala più ampia. Non impiegare il prodotto su pavimenti e superfici in resina artificiale.

## COMPATIBILITÀ:

Il prodotto si impiega da solo.