



1 + 1 = 3

BISMARK

LA GIUSTA SOLUZIONE

- Azione superiore nei confronti dei **giavoni** e assenza di problemi radicali rispetto a prodotti analoghi
- Efficace su GRAMINACEE, ABUTILON, BIDENS e altre foglie larghe
- Essenziale nel controllo dei **giavoni "resistenti"**
- **Miscibile con erbicidi a diverso meccanismo d'azione** e ideale in strategia con **Sirtaki e Tripion E**

BISMARK®



Erbicida completo per soia, riso, tabacco, patata, leguminose ed orticole

COMPOSIZIONE	Clomazone 4,9% (55 g/L) Pendimetalin 24,56% (275 g/L)
FORMULAZIONE	Sospensione di microcapsule
GRUPPO	HRAC K1; F4
N. REGISTRAZIONE	16364 del 01-04-2015
CONFEZIONE	1 L (x 10), 5 L (x 4), 10 L (x 1)

COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
SOIA	2 - 2,5 l/ha Pre-emergenza	-
RISO seminato in asciutta	2 - 3 l/ha Pre-emergenza	-
TABACCO	2,5 - 3 l/ha Pre-trapianto	-
PATATA	1,5 - 2 l/ha Pre-emergenza anche dopo la rincalzatura. Sulla cv. di patata Agata, impiegare le dosi inferiori, soprattutto se impiegato in miscela con METRIBUZIN	-
FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO, FAVA, FAVINO	1,5 - 2 l/ha Pre-emergenza	50 gg
CAROTA	1,5 - 2 l/ha Pre-emergenza, non impiegare in colture forzate con copertura di film plastici o tessuto-non-tessuto	-
FINOCCHIO	1,5 - 2 l/ha Pre-emergenza Pre-trapianto	-
ASPARAGO	2 - 3 l/ha Post-raccolta anche in presenza di coltura, su terreno preparato in pre-emergenza delle infestanti	-
MAIS	1,5 - 2,0 l/ha Pre-emergenza Post-emergenza precoce	-
COLZA	1,2 - 1,5 l/ha Pre-emergenza	-
CORIANDOLO (coltura portaseme)	1,5 l/ha Pre-emergenza	-
COTONE	2 - 2,5 l/ha Pre-emergenza	-

CARATTERISTICHE

BISMARK è la soluzione erbicida residuale completa, in formulazione sospensione di microcapsule con tecnologia MICROPLUS®, studiata per il diserbo selettivo di pre-emergenza o pre-trapianto delle colture. BISMARK è caratterizzato da un rapporto ideale dei principi attivi che vengono rilasciati in modo sincronizzato ed omogeneo. Questo speciale effetto, definito TWIN-POWER, consente di avere costantemente il giusto rapporto di pendimetalin e clomazone biodisponibile per le infestanti su qualsiasi tipologia di terreno.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Per proteggere gli organismi acquatici, applicare il prodotto rispettando una fascia vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di: 10 m per patata, fagiolo, fagiolino, pisello, fava, favino, carota, coriandolo, finocchio, colza, mais, cotone 15 m per soia 20 m per riso, tabacco e asparago

IMPIEGO SU COLTURE PORTASEME

destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme)

BISMARK®

COLTURA	AVVERSITÀ
COLTURE PORTASEME (Riso, Soia, Patata, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Fava, Favino, Carota, Finocchio, Asparago, Mais, Colza, Cotone, Coriandolo)	Vedi singole colture

INFESTANTI SENSIBILI

Graminacee: *Alopecurus sp.* (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Setaria sp.* (Pabbio), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme).

Dicotiledoni: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Datura stramonium* (Stramonio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga comune), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Galium aparine* (Attaccamano), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Poligono rosso), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Fallopia convolvulus* (Fallopia), *Cap-sella bursa-pastoris* (Borsa pastore), *Senecio vulgaris* (Senecio comune), *Stellaria media* (Centocchio), *Sonchus sp.* (Grespino dei campi), *Veronica persica* (Veronica).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Dicotiledoni: *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Diplo-taxis erucoideis* (Rucola selvatica).